

PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS

	Xaneiro		Febreiro		Marzo		Abril		Maio		Xuño		Xullo		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Decembro		
PATACA cedo		①		③④⑥ ③⑦		⑧		⑨	⑪		⑪		⑫	⑬				⑫							
PATACA tarde	⑬	① ⑬				③④⑥ ③	⑦	⑧	⑪		⑨ ⑪		⑪				⑫	⑫ ⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬
CEBOLA	⑬	① ② ⑬	⑬	⑬	③④⑥ ⑧③ ⑬	⑦ ⑬	⑬		⑪		⑪		⑪		⑫	⑫	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬
FABA		① ②						③④⑥ ⑧③	⑦	⑩	⑩		⑪		⑪		⑪		⑫	⑫	⑫				
NABIZA cedo															① ②	③⑤⑥ ③⑦		⑪	⑫	⑫	⑫				
GRELO CEDO	⑫	⑫													① ②	③⑤⑥ ③⑦		⑪						⑫	⑫
NABIZA tarde	⑫														②		①	③⑤⑥ ③⑦		⑫		⑫	⑫	⑫	
GRELO tarde			⑫	⑫	⑫	⑫									②		①	③⑤⑥ ③⑦		⑫					

LENDA:

① = Abono materia orgánica
 ② = Encalado
 ③ = Fresar
 ④ = Vesar
 ⑤ = Subsolador
 ⑥ = Abonado de fondo
 ⑦ = Plantación

⑧ = Tratamento herbicida
 ⑨ = Aporcado
 ⑩ = Estacar
 ⑪ = Tratamento fitosanitario
 ⑫ = Recollida
 ⑬ = Almacenamento

ROTACIÓN DE CULTIVOS

PARCELAS	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Parcela 1 (Millaral)	Pataca de tarde + (Veza + Avea)	Cebola + (Trebo violeta + Raygrass italiano)	Pataca de tarde + Nabos de tarde
Parcela 2 (Devesa)	Nabos de tarde	Pataca de tarde + (Veza + Avea)	Cebola
Parcela 3 (Agro Novo)	Cebola + (Veza + Avea)	Pataca de cedo + Nabos de tarde	Pataca de cedo + Nabos de tarde
Parcela 4 (Manxoeiro)	Cebola + Nabo forraxeiro	Pataca de tarde + (Trebo violeta + Raygrass italiano)	Cebola
Parcela 5 (Agro de Carlos)	Pataca de cedo + (Trebo violeta + Raygrass italiano)	Pataca de tarde + Grelo de tarde	Cebola
Parcela 6 (Ponte Nova)	Grelo de cedo) + (Trebo violeta + raygrass italiano)	Grelo de cedo	Veza + Avea
Parcela 7 (Pedreira)	Grelo de cedo + (Trebo violeta + raygrass italiano)	Grelo de cedo	(Trebo violeta + Raygrass italiano)
Parcela 8 (Leira Corral)	Nabo forraxeiro	Fabas + Nabo forraxeiro	Fabas
Parcela 9 (Menora)	Fabas + Nabo forraxeiro	Fabas + Nabo forraxeiro	Fabas
Parcela 10 (A Grela)	Toxo	Toxo	Toxo

O principal criterio que se utiliza para a rotación é o cambio de familia botánica. Nalgúns casos como nas Parcelas 6-7 a rotación está condicionada por parámetros da finca. Neste casos repítese o cultivo de nabo de cedo por ser parcelas cunha alta humidade, xa que estan ao lado do río, e este necesita humidade no nacemento, factor que na época de sementeira pode faltar.

No caso das parcelas 8-9 repítese o cultivo das fabas porque necesitan rego continuado, sendo o máis axeitado por goteo. Estas dúas leiras son as únicas que dispoñen de toma de rego, ademais de se situar cerca da nave-almacén, facilitando así as técnicas de cultivo que necesita.

Os restantes cultivos procuranse instalar nas parcelas de maior tamaño, xa que son cultivos dunha alta mecanización.