

## Anexo 3.- Descripción das variedades

A fundación Juana de Vega, caracterizou no seu proxecto “Variedades de vid de interés comercial para la zona vitícola de Betanzos” a ampelografía dos brotes, follas, acios e bagas das variedades Branco Lexítimo e Agudelo. Para isto utilizou a metodoloxía da Organización Internacional da Viña e do Viño (OIV).

Este é o resultado de ese traballo:

	Código OIV	Agudelo	Branco Lexítimo
<b>Brotes:</b>			
Forma da extremidade	001	Aberta	Aberta
Distrib. pigmentación antocianica da extremidade	002	Ribeteada	Ribeteada
Intensidade pigmentación antocianica da extremidade	003	Feble	Feble
Densidade dos pelos deitados na extremidade	004	Media/Alta	Media/Alta
Densidade dos pelos ergueitos na extremidade	005	Nula/Moi baixa	Nula/Moi baixa
<b>Folla adulta:</b>			
Forma do limbo	067	Pentagonal	Pentagonal
Nº lóbulos	068	Cinco	Tres/Cinco
Cor do haz	069	Verde medio	Verde claro
Pigmentación antociánica dos nervios principais do haz	070	Nula	Feble
Pigmentación antociánica dos nervios principais do envés	071	Nula	Moi feble
Forma dos dentes	076	Convexos	Rect.-convexo
Forma do seno peciolar	079	Aberto	Aberto/lob. Superior
Forma da base do seno peciolar	080	En V	En V
Particularidades do seno peciolar	081	Ningunha	Ningunha
Forma dos senos laterais superiores	082	Abertos/lix. Superpostos	Abertos
Forma da base dos senos laterais superiores	083	En V	En V
Dens dos pelos deitados entre os nervios ppais do envés	084	Media	Baixa
Dens dos pelos ergueitos entre os nervios ppais do envés	085	Baixa	Media
Dens dos pelos deitados sobre os nervios ppais do envés	086	Baixa	Baixa
Dens dos pelos ergueitos sobre os nervios ppais do envés	087	Nula/moi baixa	Media
Vellosidade deitada sobre os nervios ppais do haz	088	Ausente	Ausente
Vellosidade ergueita sobre os nervios ppais do haz	089	Ausente	Ausente
<b>Acio:</b>			
Compacidade do acio	204	Media	Media
Morfoloxía do acio	208	Cónico	Cónico
<b>Baia:</b>			
Uniformidade tamaño	222	Uniforme	Uniforme
Forma da baia	223	Esférica	Elíptica curta
Cor da epidermis	225	Verde amarelento	Verde amarelento
Uniformidade na cor da epidermis	226	Uniforme	Uniforme
Pruína da baia	227	Media	Media
Ombrigo da baia	229	Pouco aparente	Pouco aparente
Pigmentación pulpa	230	Non pigmentada	Non pigmentada
Intensidade pigmentación pulpa	231	Non pigm/pigm feble	Non pigm/pigm feble
Suculencia pulpa	232	Xugosa	Xugosa
Consistencia pulpa	235	Branda	Branda
Sabores particulares pulpa	236	Ningún	Sabor a moscatel
Clasificación sabor baia	237	Neutro	Lixeiro gusto a moscatel
Separación pedicelo	239	Doado	Doado
Presencia anel na baia	**	Presente	Presente

\*\* Martínez, Perez e Mantilla (CSIC 1993)